



Algorithme / induction de Coumadine® chez l'adulte de 18 à 70 ans

Procédure conçue et agréée par le réseau GRANTED, pour son usage spécifique

Version 2016 : M. Fontaine, G. Pernod
Première diffusion 2010 : J. Yver, G. Pernod
Page : 1
Destinataires : médecins

1 Objet

- Mise en route d'un traitement anticoagulant par **Coumadine®** chez l'adulte de 18 à 70 ans.
- L'utilisation exclusive de la Coumadine® **2 mg** est conseillée en début de traitement pour éviter toute confusion entre les 2 dosages.

2 Algorithme

| Jour | Dose mg avant INR | INR matin (entre... et ...) | Saut de prise (jour) | Dose mg après INR | Intervalle entre 2 INR (Nbre jours) |
|------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| J1 | 0 | 1 - 1,40 | 0 | 5 mg | 2 |
| J4 | 5 mg | 1 - 1,30 | 0 | 8 mg | 3 |
| J4 | 5 mg | 1,30 - 1,60 | 0 | 7 mg | 3 |
| J4 | 5 mg | 1,60 - 1,90 | 0 | 6 mg | 3 |
| J4 | 5 mg | 1,90 - 2,20 | 0 | 5 mg | 3 |
| J4 | 5 mg | 2,20 - 2,60 | 0 | 4 mg | 3 |
| J4 | 5 mg | 2,60 - 3 | 0 | 3 mg | 3 |
| J4 | 5 mg | 3 - 3,60 | 0 | 2 mg | 3 |
| J4 | 5 mg | 3,60 - 4,40 | 1 | 1 mg | 3 |
| J4 | 5 mg | > 4,40 | 2 | 0 | 1 |

Références

Adapté de Crowther 1999
Arch Intern Med. 1999 Jan 11;159(1):46-8.

Auteurs groupe de rédaction et de lecture

Dr M. Fontaine, médecine vasculaire GHM Grenoble
Dr J.Yver, médecine vasculaire CHU Grenoble Alpes
Pr G. Pernod, médecine vasculaire CHU Grenoble Alpes

