Demande d'écho-doppler vasculaire en période d'épidémie SARS-CoV 2

Evaluation de l'indication

Différable ?

Urgente, non différable :

Remplaçable par un examen de type scanner/IRM ?

oui | non

A différer

Examens différables (Liste non exhaustive) :

1) **Echo-doppler veineux MS/MI:**
- suspicion TVP chez un patient ayant une autre indication d'anticoagulation
- EP confirmée
- contrôle de TVP sans nouveau signe clinique
- bilan d'insuffisance veineuse (même en présence d'un trouble trophique veineux)

2) **Echo-doppler TSA :**
- réévaluation d'une sténose asymptomatique
- bilan d'athérosclérose polyvasculaire

3) **Echo-doppler artériel des membres inférieurs** :
- contrôles post-opératoires/suivi AOMI des patients ne présentant pas de dégradation clinique
- bilan d'une AOMI au stade d'ischémie d'effort

4) **Echo-doppler des artères rénales** :
- bilan d'HTA résistante
- bilan d'insuffisance rénale chronique

A Remplacer

Examens urgents, remplaçables (Liste non exhaustive) :

1) **Echo-doppler veineux MS/MI** :
- suspicion d'EP : AngioTDM/scintigraphie pulmonaire si CI à l'angioTDM

2) **Echo-doppler TSA** :
- suspicion de dissection TSA: AngioTDM/angioIRM si possible en même temps que l'imagerie cérébrale

3) **Echo-doppler artériel MI** :
- ischémie chronique menaçante/ischémie aigue : angioTDM MI

4) **Echo-doppler artères digestives :**
- Suspicion d'ischémie mésentérique : angioTDM abdominale

A Maintenir

Examens urgents, non différables (Liste non exhaustive) :

1) **Echo-doppler veineux MS/MI** :
- suspicion de TVP chez un patient n'ayant pas d'autre indication d'anticoagulation
- suspicion d'EP chez la femme enceinte (hors exception*)
- TIH suspectée/avérée

2) **Echo-doppler TSA** :
- AIT/AVC ischémique et n'ayant pas pu avoir une exploration par angioscanner/IRM des TSAo au moment de l'exploration cérébrale initiale

3) **Echo-doppler artériel des membres inférieurs** :
- ischémie aigue ou chronique menaçante ayant une contre-indication à la réalisation d'un angioscanner (insuffisance rénale, allergie)

4) **Echo-doppler des artères rénales** :
- Insuffisance rénale aigue de cause vasculaire suspectée

5) **Echo-doppler de fistule** :
- suspicion de thrombose de FAV

**grossesse + suspicion EP + suspicion COVID : angioTDM thoracique*

Équipement

COVID(+)/statut COVID (?) : réduire au maximum le temps d'examen

Opérateur : Équipement de protection maximal dans la mesure de la dotation : masque chirgical (idéalement FFP2), lunettes, charlottes, surblouse, gants, surchaussures

Patient : masque chirurgical

COVID(-)

Opérateur : Masque chirurgical, +/- gants

Patient : (si symptomatique) : masque chirurgical