



SUGGESTIONS DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN VILLE DANS LE CONTEXTE DE COVID-19

Conduite à tenir en cas de suspicion de MTEV adressée au cabinet (*examen clinique et score de Wells*) :

- **PATIENT COVID- OU ASYMPTOMATIQUE :**
Examiner avec masque chirurgical/gants et solution hydro-alcoolique
- **PATIENT CONTACT OU FÉBRILE +/- TOUX :**
Mettre un masque chirurgical au patient
Examiner avec masque (chirurgical en priorité voire FFP2 si dispo*)
charlotte/blouse/gants et solution hydro-alcoolique
- **PATIENT COVID AVÉRÉ ET CONFINÉ CHEZ LUI :**
Mettre un masque chirurgical au patient
Examiner avec masque (chirurgical en priorité voire FFP2 si dispo*)
charlotte/blouse/gants et solution hydro-alcoolique
Si MTEV : hospitalisation (car possible signe d'aggravation) via le 15

Ces suggestions sont transposables à d'autres pathologies nécessitant une exploration (voir les recommandations de la SCVE ci-dessous).

De plus elles sont à adapter en fonction des comorbidités du patient (obésité, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, cancer, BPCO...) et des possibilités d'hospitalisation.

**Les masques FFP2 sont à réserver aux personnels avec contact prolongé avec les patients suspects Covid.*

