

ENQUETE DE L'INTERNATIONAL COMPRESSION CLUB (ICC) CLUB INTERNATIONAL SUR LA COMPRESSION

Le Pr H. Partsch souhaite la participation des médecins vasculaires français ou francophones à une enquête de l'ICC (International Compression Club) sur la compression dans la TVP aigue ...

Site ICC : www.icc-compressionclub.com

Survey: compression in acute DVT - Cliquer sur <https://umfrageonline.com/s/ff59259>

Merci de répondre au questionnaire dans les meilleurs délais et au plus tard avant la fin juin.

Pour ceux qui ont quelques difficultés avec l'anglais, le questionnaire a été traduit. Aidez-vous du texte en français pour cocher vos réponses dans le questionnaire en anglais sur <https://umfrageonline.com/s/ff59259>

Comment je traite une TVP proximale * chez un patient symptomatique externe **

* TVP intéressant l'axe veineux poplité et/ou fémorale et/ou iliaque avec ou sans TVP distale.

** Non hospitalisé, en ambulatoire

- 1- Pays de résidence (*Choisir dans la liste*)
- 2- Votre spécialité (*Cocher la case correspondante*)
- 3- En moyenne, combien voyez-vous de patients avec TVP proximale / mois ? (*Cocher la case correspondante*)
- 4- Où traiter-vous les patients avec TVP proximale ?
 - 0 - En milieu hospitalier, soit en hospitalisé soit en consultation externe
 - 0 - En milieu hospitalier, en hospitalisé et en consultation externe
 - 0 - Seulement en hospitalisation
 - 0 - Seulement en unité de consultation externe
 - 0 - Seulement à la maison
- 5- Approximativement, combien de patients avec TVP proximale
nécessitent une hospitalisation ? (*cocher la case correspondante*)
sont traités à la maison ? (*cocher la case correspondante*)
- 6- Si hospitalisation, combien de temps imposez-vous l'alitement ? (*cocher la case correspondante*)
- 7- Faites-vous une recherche de cancer chez les patients avec TVP proximale ?
 - 0 - Oui, chez tous les patients
 - 0 - Oui, mais seulement dans certains cas
 - 0 - Non

8-Quelle anticoagulation initiale utilisez-vous dans la majorité des cas ?

- 0 - HNF
- 0 - HBPM
- 0 - Fondaparinux
- 0 - Anticoagulant Oral Direct

9- Quelle anticoagulation utilisez-vous en phase secondaire dans la majorité des cas ?

- 0 - AVK
- 0 - Anticoagulant Oral Direct

10- Quand initiez-vous un traitement compressif ?

- 0 - Je ne prescris pas de compression en routine
- 0 - Je démarre la compression immédiatement
- 0 - Je démarre la compression durant la première semaine
- 0 - Je démarre la compression au-delà de la première semaine

11- Si vous prescrivez une compression élastique, quelle pression à la cheville ?

- 0 - < 20 mmHg
- 0 - 20 à 30 mmHg
- 0 - 30 à 40 mmHg
- 0 - > 40 mmHg

12- Si vous prescrivez une compression élastique, de quel type ?

- 0 - Chaussettes
- 0 - Bas cuisse
- 0 - Collant

13- Prescrivez des bandages pour une TVP aigüe proximale ?

- 0 - Oui
- 0 - Non

14- Si oui, qui applique le bandage ?

- 0 - Vous-même ou le médecin traitant
- 0 - Une infirmière
- 0 - Le patient

15- Si vous prescrivez une compression en phase aigüe de TVP proximale, quelles sont les raisons principales ? (*Cochez les 3 raisons les plus appropriées*)

- 0 - Réduction de la douleur et de la grosse jambe
- 0 - Réduction du risque de syndrome post-thrombotique
- 0 - Réduction de la progression de la TVP ou de la récurrence de TVP
- 0 - Réduction du risque d'EP
- 0 - Aide à la mobilisation

16- Si vous prescrivez une compression en phase secondaire de TVP proximale, quelles sont les raisons principales ? (*Cochez les 3 raisons les plus appropriées*)

- 0 - Réduction de l'œdème et des symptômes
- 0 - Réduction du risque de syndrome post-thrombotique
- 0 - Prévention de la récurrence de TVP
- 0 - Prévention de la récurrence d'EP
- 0 - Amélioration de la capacité de marche

17- Prescrivez-vous une compression après la phase aigüe de TVP en routine à tout patient ?

- 0 - Oui
- 0 - Non

- 18-** Si vous ne prescrivez pas de compression en routine après la phase aigüe de TVP, dans quel(s) cas décidez-vous d'une compression ? *(Cochez les 3 raisons les plus appropriées)*
- 0 - Persistance d'une grosse jambe ou de symptômes
 - 0 - Présence d'un syndrome post-thrombotique
 - 0 - Présence de lésions post-thrombotiques sur les veines profondes
 - 0 - Présence d'un reflux veineux profond
 - 0 - Présence d'une insuffisance veineuse superficielle
- 19-** Recommandez-vous la compression post-TVP pour une durée fixe ?
- 0 - Oui
 - 0 - Non
- 20-** Si vous recommandez la compression pour une durée fixe, pour combien de temps ?
- 0 - 3 à 6 mois
 - 0 - 6 mois à 1 an
 - 0 - 1 à 2 ans
 - 0 - plus de 2 ans
- 21-** Si vous ne recommandez pas la compression post-TVP pour une durée fixe, sur quel(s) arguments déterminez-vous la durée de compression ? *(Cochez les 3 raisons les plus appropriées)*
- 0 - Présence de symptômes
 - 0 - Présence d'une grosse jambe
 - 0 - Présence d'un syndrome post-thrombotique
 - 0 - Présence d'un syndrome post-thrombotique
 - 0 - Présence d'une insuffisance veineuse superficielle
- 22-** Estimez le pourcentage de vos patients qui portent la compression prescrite après la phase aigüe de TVP. Combien la porte
- quotidiennement (5 à 7 jours / sem.) ? *(Cocher la case correspondante)*
 - occasionnellement 3 à 5 jours / sem.) ? *(Cocher la case correspondante)*
 - rarement (<3 jours / sem.) ? *(Cocher la case correspondante)*
 - jamais ? *(Cocher la case correspondante)*
- 23-** Est-ce que votre management de la compression a récemment évolué du fait de votre expérience personnelle, de recommandations ou publications ?
- 0 - Oui
 - 0 - Non
- 24-** Si oui, dans quel sens a-t-il changé ? *(plusieurs réponses possibles)*
- 0 - Début plus précoce de la compression
 - 0 - Début plus tardif de la compression
 - 0 - En général, compression plus souvent prescrite
 - 0 - En général, compression moins souvent prescrites
- 29-** En général, recommandez-vous des exercices de marche ?
- 0 - Oui
 - 0 - Non
- 30-** En général, recommandez-vous de la physiothérapie ?
- 0 - Oui
 - 0 - Non